

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

D L P. 15 - 5 - 62 - 03182

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(Tél.: 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER
C. C. P., MONTPELLIER 5.236.57

12 N.F.

2^e Supplément au n° 20
AVEYRON - LOZÈRE
14 Mai 1962

VIGNE

BLACK ROT

De nombreuses parcelles ont été touchées par cette maladie en 1961 (Vallée du Lot en particulier). Il est actuellement nécessaire de réaliser un traitement ; les prochaines pluies pouvant entraîner des contaminations graves sur la jeune végétation qui se développe rapidement.

Le traitement doit être réalisé dès réception du présent avis à l'aide d'un produit cuprique ou d'un produit organique (voir "Bulletin Black-rot" publié au début du mois de mars 1962).

MILDIOU

Il ne semble pas que la maladie soit encore présente dans le vignoble, d'ailleurs elle sera arrêtée par le traitement destiné à combattre le Black-rot.

OIDIUM

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de l'Oïdium. Il faut traiter immédiatement si l'on veut réussir la lutte.

Ajouter un soufre mouillable à la bouillie pulvérisée contre le Black-rot, ou, sur les cépages très sensibles à l'Oïdium, procéder à un soufrage.

CIGARIERS

Ces coléoptères roulent les feuilles en cigare, d'où leur nom. Dès l'apparition des premiers insectes (vert ou bleu métallique), employer du D.D.T., de l'H.C.H., du Lindane, du Parathion, de l'Aldrin ou du Chlordane.

Ce traitement sera également valable contre les Altises.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES et OIDIUMS

Les traitements préconisés le 30 avril cessent d'être efficaces. Les renouveler immédiatement.

PUCERONS et ARAIGNEES ROUGES

Ces ravageurs se manifestent dans de très nombreux vergers. Ajouter un insecticide ou un acaricide à la bouillie anticryptogamique.

CARPOCAPSE

Il est inutile de prévoir un traitement particulier ; les conditions de son évolution n'étant pas réunies.

HYPONOMEUTE et CHENILLES TORDEUSES

Si la présence de ces insectes est constatée, traiter immédiatement avec une bouillie à base de Phosdrine, d'Oléoparathion ou même d'arséniate de plomb.

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Les pommes de terre de primeur devront recevoir une bouillie protectrice, la maladie pouvant se manifester à brève échéance si la température s'élève.

L'Inspecteur : P. BERVILLE

Le Contrôleur : L.L. TROUILLON

Imprimerie de la Station du Languedoc-Roussillon. Le Directeur Gérant : L. BOUYX

1962-20

P435